



## Betula costata



<b>Magasság</b>	12 – 25 (30) m
<b>Szélesség</b>	10-15m
<b>Korona</b>	broad ovoid to round, half-open crown
<b>Kéreg és ágak</b>	light grey-brown to greyish yellow, flaking
<b>Leaf</b>	ovoid to narrow ovoid, green, 5 - 10 cm
<b>Virágok</b>	catkins, single and erect, 4 - 6 cm, April
<b>Gyümölcsök</b>	ovoid fruiting catkins, 2 - 3 cm
<b>Tüskés/tövises</b>	egyik sem
<b>Mérgező tulajdonság</b>	rendszerint nem mérgező emberek, (nagytestű) háziállatok és haszonállatok számára
<b>Talajtípus</b>	few soil requirements, not drought-tolerant
<b>Ültetési hely követelményei</b>	Nem viseli el az útburkolatokat
<b>télállóság</b>	5a (-28,8 és -26,1 °C)
<b>Szélellenállóság</b>	moderate
<b>Egyéb tűrőképességek</b>	fagyűrő (télállósági fok: 1-6)
<b>Fauna fák</b>	fagyűrő (télállósági fok: 1-6), gazdanövény pillangók számára
<b>Forma</b>	magas törzsű fa, többtörzsű fa
<b>Eredet</b>	Eastern and central China, Korea, Manchuria

Large tree with a broad ovoid to rounded, semi-open crown. Needs a lot of space due to its broad, fairly low branching pattern. Has attractively flaking branches and bark. Not to be confused with types of *B. ermanii*, especially 'Blush', which is still being grown as *B. costata*. One difference is that the bark of *B. costata* already starts to peel in the second or third year, while that of *B. ermanii* only starts when mature. Another is that the first-year twigs of *B. costata* are rough and those of *B. ermanii* are smooth. Finally, the leaves of *B. costata* are more than twice as long as they are wide, and have a straight leaf base. The leaves of *B. ermanii* are shorter and have a somewhat heart-shaped leaf base. Has poor tolerance for drought and is sensitive to (sea) wind.