



Catalpa xerubescens 'Purpurea'



Magasság	10 - 12 (15) m
Szélesség	6-10m
Korona	wide pyramidal, later ovoid to round, half-open crown
Kéreg és ágak	grey, shallow fissured
Leaf	heart-shaped, purplish-red, later dark green, 13 - 18 cm
Virágok	white, in large erect panicles, July/August (September)
Gyümölcsök	thin capsules, to 35 cm long
Tüskés/tövises	egyik sem
Mérgező tulajdonság	rendszerint nem mérgező emberek, (nagytestű) háziállatok és haszonállatok számára
Talajtípus	few requirements, not in wet soils
Ültetési hely követelményei	Nem viseli el az útburkolatokat
télállóság	6a (-23,3 és -20,6 °C)
Szélellenállóság	moderate to poor
Egyéb tűrőképességek	fagyűrő (télállósági fok: 1-6)
Fauna fák	fagyűrő (télállósági fok: 1-6), mézelő fa
Forma	magas törzsű fa, többtörzsű fa
Eredet	A. Waterer, England, before 1886

An average-sized tree with a half-open crown, which is pyramidal initially, but later ovoid to round-headed. The hard wood of the twigs breaks easily. The acuminate and entire, ovate leaf appears late in spring and it is dark purplish-red to almost black. Also the young twigs are dark in colour. In summer the leaf turns dark green, it is slightly smaller than of *C. erubescens* and is shed relatively early. The white, tubular flowers are smaller than of *C. bignonioides* and appear in erect, long panicles of 25 to 35 cm. Inside the flowers are yellow and have small brown spots. They are followed by long, capsules that are 1 cm thick at the most. These persist during winter.