




Quercus robur 'Timuki'



Magasság	15 - 20 m
Szélesség	8-12m
Korona	round, half-open crown
Kéreg és ágak	twigs dark brown, bark dark grey, deeply grooved
Leaf	obovate, lobed, dark greenish purple, 7 - 14 cm
Virágok	green-yellow catkins, 2 - 4 cm, May
Gyümölcsök	ovate to oval, 1.5 - 2.5 cm, in groups of 2 - 6, cupule with triangular contiguous scales
Tüskés/tövisek	egyik sem
Mérgező tulajdonság	rendszerint nem mérgező emberek, (nagytestű) háziállatok és haszonállatok számára
Talajtípus	fertile and moist
Talajnedvesség	Nedves talajon használható
Ültetési hely követelményei	Nem viseli el az útburkolatokat
télállóság	5a (-28,8 és -26,1 °C)
Szélellenállóság	good
Egyéb tűrőképességek	fagyűrő (télállósági fok: 1-6), szélűrő, útsónak ellenáll
Alkalmazások	ipari terület
Forma	magas törzsű fa
Eredet	Raimond Cinovskis, Riga, Latvia, 1946

Red-leaved cultivar of *Q. robur* with a broad ovoid crown, eventually becoming round. Grows significantly better than the old purple-leaved cultivar, 'Purpurascens'. The bark, blossom and fruit are the same as the species. The obovate leaves are, in terms of shape, also like the species although they are larger than on 'Purpurascens'. On emerging the leaf is green but it gradually turns darker, and at the end of summer it turns through red to a glossy dark greenish purple. The tree was found by M. Timuki in 1939 but was only named and distributed in 1946. The good growth and lovely foliage colours are the most important features of this purple-leaved oak. In addition, 'Timuki' is significantly less susceptible to mildew.