



Sorbus ×arnoldiana 'Schouten'



Magasság	8 - 10 m
Szélesség	3-5m
Korona	ovoid, half-open crown
Kéreg és ágak	grey, smooth, later a little flaky
Leaf	imparipinnate, approx. 20 cm long, 9 - 17 (21) leaflets, dark green, feathered leaf
Őszi színek	narancs, piros
Virágok	in umbels, Ø approx. 15 cm, white flowers, May/June
Gyümölcsök	orange-yellow, in wide umbels, August/September
Tüskés/tövises	egyik sem
Mérgező tulajdonság	rendszerint nem mérgező emberek, (nagytestű) háziállatok és haszonállatok számára
Talajtípus	preferably slightly acid humic soil
Talajnedvesség	Száraz talajon használható
Ültetési hely követelményei	Elviseli a laza útburkolatot
télállóság	6a (-23,3 és -20,6 °C)
Szélellenállóság	good
Egyéb tűrőképességek	fagyűrő (télállósági fok: 1-6), széltűrő
Fauna fák	fagyűrő (télállósági fok: 1-6), széltűrő, madártápláló fa
Alkalmazások	sugárutak és széles utcák
Forma	magas törzsű fa
Eredet	Brouwers Boomkwekerij B.V., Groenekan, The Netherlands, circa 1950

This tree forms a fairly dense ovoid crown that later becomes more rounded. The leaves are imparipinnate and consist of 9 - 17 (21) lanceolate leaflets. These are 5 - 7 cm long and 2 - 3 cm wide and have a finely serrated leaf edge. The autumn colour is orange-red. The large felt-like flower umbels consist of many white flowers. As early as August the orange-yellow fruits appear, diameter approx. 1 cm, and they remain on the tree until approx. mid-September. The tree produces less fruit than other cultivars. 'Schouten' prefers slightly acid humic soil but also flourishes on dry sandy soils. The tree was discovered around 1950 in a consignment of *S. discolor* seedlings. Later 'Schouten' turned out to belong to the *S. x arnoldiana* hybrid.