



Tilia cordata 'Rancho'



Magasság	10 - 15 m
Szélesség	6-9m
Korona	narrow conical, later narrow ovoid, half-open crown
Kéreg és ágak	dark brown, grooved trunk, young twigs green, reddish-brown later
Leaf	more or less round, heart-shaped base, dark green, 5 to 12 cm
Őszi színek	sárga
Virágok	in umbels, 5 - 10 together, yellow to cream-coloured, pungent, June/July, fragrant flowers
Gyümölcsök	round-ovoid, Ø 0.5 – 0.8 cm, first felt-like, later bare
Tüskés/tövises	egyik sem
Mérgező tulajdonság	rendszerint nem mérgező emberek, (nagytestű) háziállatok és haszonállatok számára
Talajtípus	any, tolerates dry conditions
Talajnedvesség	Száraz talajon használható
Ültetési hely követelményei	Elviseli a szilárd útburkolatot
télállóság	4 (-34,4 és -28,9 °C)
Szélellenállóság	very good, also tolerates sea wind
Egyéb tűrőképességek	fagytűrő (télállósági fok: 1-6), széltűrő
Fauna fák	fagytűrő (télállósági fok: 1-6), széltűrő, gazdanövény pillangók számára
Alkalmazások	sugárutak és széles utcák, keskeny utcák, tengerpart
Forma	magas törzsű fa
Eredet	E. H. Scanlon, Olmsted Falls, Ohio, USA, 1961

American cultivar that greatly resembles 'Böhlje'. Develops a tight, narrow, pyramidal crown that later becomes narrow ovoid. 'Rancho' has a regular, upwards-slanting branching pattern. The lower branches are at a 45° angle to the straight trunk: the upper branches are at a 30° angle. The tree ultimately becomes approx. 6 m wide. The dark green leaves are somewhat larger and wider than those of the species, with a heart-shaped base, tapering to an abrupt point at the top. The leaves turn a remarkable yellow colour in the autumn. Pungent flowers appear in early summer, growing in short umbels. The light green bract is somewhat shorter than the umbel. Small fruit follows in late summer. T. cordata and its cultivars are fairly unsusceptible to aphids. Its narrow manner of growth makes 'Rancho' excellently suitable for streets and avenues.