



Ulmus minor



Magasság	20 - 30 m, fast growing
Szélesség	12-15m
Korona	broad fan-shaped to broad oval, half-open crown, capricious growing
Kéreg és ágak	has brownish-grey grooves, flakes off in platelets, twigs brown
Leaf	oval-elongated to obovate, glossy green, 5 - 10 cm
Virágok	in very dense bundles, purplish-red, March, before the leaves emerge
Gyümölcsök	winged nutlet, 1.5 - 2 cm
Tüskés/tövisek	egyik sem
Mérgező tulajdonság	rendszerint nem mérgező emberek, (nagytestű) háziállatok és haszonállatok számára
Talajtípus	moist and light, favours calcareous soils
Talajnedvesség	Nedves talajon használható, rövid idejű árvíznek ellenáll, hosszú idejű árvíznek ellenáll
Ültetési hely követelményei	Nem viseli el az útburkolatokat
télállóság	5 (-28,8 és -23,4 °C)
Szélellenállóság	very good, also tolerates sea wind
Egyéb tűrőképességek	fagytűrő (télállósági fok: 1-6), széltűrő
Fauna fák	fagytűrő (télállósági fok: 1-6), széltűrő, gazdanövény pillangók számára
Alkalmazások	sugárutak és széles utcák, tengerpart, ipari terület
Forma	magas törzsű fa, többtörzsű fa
Eredet	western Europe, north Africa, south-west Asia
Szinonimák	Ulmus carpinifolia, Ulmus campestris

Fast-growing tall tree with a dense crown and a variable manner of growth, from broad fan-shaped to broad oval. Occasionally a cork layer occurs on the bare twigs. The leaves are oval-elongated to obovate, widest in or above the centre. On the upper side they are smooth and glossy green, on the underside practically bare. The foot of the leaf covers one side of the short stalk, a characteristic of elm leaves. The leaf edge is double-serrated. The flowers grow in very dense bundles of 15 to 30 together. They appear before the leaves emerge and are purplish-red. The winged fruits are also often present before the emergence of the leaves: the fruits are then still green but later turn brown. It is fairly badly sensitive to Dutch elm disease. Ulmus minor used to be planted a great deal but is very little cultivated at present.