




Acer xzoeschense 'Annae'



Magasság	8 - 10 m
Szélesség	6-8m
Korona	round, spherical, half-open crown
Kéreg és ágak	bark grey-brown, young twigs red
Leaf	3/5-lobed, dark green, 5 - 8 cm
Őszi színek	narancs, piros
Virágok	yellow-green corymbs, May
Gyümölcsök	hairy, upright wings, 3 - 5 cm
Tüskés/tövises	egyik sem
Mérgező tulajdonság	rendszerint nem mérgező emberek, (nagytestű) háziállatok és haszonállatok számára
Talajtípus	any soils
Ültetési hely követelményei	Elviseli a laza útburkolatot
télállóság	6a (-23,3 és -20,6 °C)
Szélellenállóság	good
Egyéb tűrőképességek	fagytűrő (télállósági fok: 1-6), széltűrő
Fauna fák	fagytűrő (télállósági fok: 1-6), széltűrő, gazdanövény pillangók számára
Alkalmazások	faültető edények, tetőkertek, ipari terület
Forma	magas törzsű fa, többtörzsű fa
Eredet	Schwerin, Germany, 1908

This medium-sized tree is a hybrid between *A. campestre* and *A. cappadocicum* subsp. *lobelii*. *A. zoeschense* 'Annae' has an open, almost spherical crown. The tree has a regular, layered habit and can reach a height of circa 10 m. The young and slender twigs that receive sufficient sunlight, turn a striking red-brown. Mature branches have a grey-brown colour. *A. zoeschense* 'Annae' does not form corky fissures on its twigs. The leaf, slightly resembling *A. campestre*, unfurls dark purple, fading gradually into dark green. The leaf margin is slightly more curvaceous than of the *A. campestre* and is a little larger. Important ornamental feature is the autumn colouring of the glossy, dark green leaf into many red to orange hues. In a sunny site it often stands out better. The fibrous root growth is shallow. Good resistance to air pollution and insensitive to diseases and pests.