



Acer platanoides 'Reitenbachii'



Magasság	15-20 m
Szélesség	10-12m
Korona	broad ovoid, dark, dense crown
Kéreg és ágak	grey
Leaf	green, redbrown
Virágok	yellowgreen, flowers in April
Gyümölcsök	brown, inconspicuous
Tüskés/tövises	egyik sem
Mérgező tulajdonság	mérgező összetevői vannak
Talajtípus	clayed soil, loamy soil, sandy soil
Talajnedvesség	rövid idejű árvíznek ellenáll
Ültetési hely követelményei	Elviseli a laza útburkolatot
télállóság	4 (-34,4 és -28,9 °C)
Szélellenállóság	not very sensitive, not resistant to sea wind
Egyéb tűrőképességek	fagyűrő (télállósági fok: 1-6)
Fauna fák	fagyűrő (télállósági fok: 1-6), gazdanövény pillangók számára
Alkalmazások	sugárutak és széles utcák
Forma	magas törzsű fa

This tree's history goes back to the nursery of J. Reitenbach in Poland, at that time part of Russia. The plant was named by Johann Xaver Robert Caspary, a German botanist, but it was introduced to the market by the Belgian nursery of Louis Van Houtte. In terms of habit, 'Reitenbachii' is typical of the species. The sprouting leaf is a shiny dark brown, turning to matt dark green with dark red veins in summer. An attractive tree, somewhat resembling 'Schwedleri', which has more intense leaf colours. Grows on any soil, but does not tolerate stagnating groundwater and peaty soils.