




Robinia ×ambigua 'Bellarosea'



igen

Magasság	6 - 8 m
Szélesség	4-6m
Korona	round, open crown, half-open crown
Kéreg és ágak	grey, deeply grooved, young shoots slightly sticky, thorny
Leaf	imparipinnate, with 13 - 21 leaf segments, elliptical, green, 1 - 4 cm, feathered leaf
Virágok	in loose clusters, pink, June/August
Gyümölcsök	flat skin, brown, elongated and smooth, 5 - 9 cm long
Tüskés/tövises	igen
Mérgező tulajdonság	mérgező összetevői vannak
Talajtípus	places little demands on soil, provided there is good drainage
Talajnedvesség	Száraz talajon használható
Ültetési hely követelményei	Elviseli a szilárd útburkolatot
télállóság	3 (-40,0 és -24,5 °C)
Szélellenállóság	bad
Egyéb tűrőképességek	fagyűrő (télállósági fok: 1-6), útsónak ellenáll
Fauna fák	fagyűrő (télállósági fok: 1-6), útsónak ellenáll, mézelő fa
Alkalmazások	ipari terület
Forma	magas törzsű fa
Eredet	Leiden, Netherlands, approx. 1860

Robinia x ambigua is a hybrid between R. pseudoacacia and R. viscosa. It has many similarities with R. pseudoacacia but its leaves are slightly smaller. The sticky, young twigs are characteristic of R. viscosa. 'Bellarosea' is a small tree with an elegant shape. The crown is rounded and open. Unlike R. x ambigua, 'Bellarosea' has branches bearing strong thorns. The imparipinnate leaves are about 24 cm in size and consist of 13 - 21 elliptical green leaf segments. Pendulous, loose clusters of large pink flowers appear in June. The flowering period lasts into August. The branches are breakable: inclement weather conditions can cause branches to break particularly when the tree is in full bloom. Consequently, a site sheltered from the wind is required. Robinia xambigua is not very sensitive to road salt and tolerates paving well.